



Kondylomer (Kønsvorter)

Skyldes Human Papilloma Virus (HPV), hvoraf 90 % skyldes undertyperne 6 og 11, hvilke overføres seksuelt. Det vil sige, at så længe, man har kondylomer, skal man beskytte sin partner ved at bruge kondom.

Inkubationstiden er 3 uger til 9 måneder, i gennemsnit 2-3 måneder.

Kondylomer kan forekomme både ude på huden, i vagina, mellemkødet, ved anus og på livmoderhalsen.

Symptomer

Kondylomer er flade, stilkede eller blomkålslignende vorter. Typisk har man flere på én gang.

Kondylomer kan give lokale gener som irritation, kløe og svie, samt kosmetiske gener. Infektionen vil for manges vedkommende være psykisk belastende.

Behandling

Kondylomer hjemmebehandles med påsmøring af Condylone, Wartex eller Aldara. Nogle gange forsvinder kondylomerne hurtigt, andre gange kan det kræve gentagne behandlinger i lang tid. Hvis behandlingen ikke får kondylomerne til at forsvinde, kan man fryse dem væk – dvs. i klinikken. Ved meget udbredte kondylomer kan man evt. få dem laserbehandlet i fuld narkose på hospitalet. Hvis du har fast partner og ikke bruger kondom, har din kæreste formentlig enten vorte-virus, selvom han/hun ikke har synlige vorter, eller han/hun er immun overfor denne virustype. Kondylomer kan desværre komme tilbage igen efter flere år.

HPV-vaccination beskytter mod kondylomer, men har ingen behandlingseffekt såfremt man allerede er inficeret (men beskytter stadig mod ny infektion med andet virus).