



## **Vandscanning**

Vandskanning bruges til at undersøge om en polyp eller muskelknude i livmoderen er årsag til fx pletblødninger, uregelmæssige menstruationer eller kraftige menstruationer. Undersøgelsen kan give lidt menstruationslignende smerter og vandigt udflåd i timerne efter.

## **Før indgrebet**

Undersøgelsen bør udelukkende udføres efter endt menstruation og ca. en uge frem – dvs. inden ægløsning. Du bedes selv sørge for, at din aftalte tid stemmer overens hermed.

Der kan forekomme menstruationslignende smerter under og efter undersøgelsen. Vi vil derfor anbefale, du tager følgende smertestillende håndkøbsmedicin ca. 1 time før indgrebet: 2 stk Panodil/Pinex 500 mg og 2 stk Ipren/Ibuprofen 200 mg. Du skal sætte 20 min. af til hele besøget, selve undersøgelsen tager 5 minutter.

## **I klinikken**

Gå gerne på toilettet inden vi kalder dig ind på stuen, da indgrebet er nemmest at udføre med en tom blære.

## **Selve undersøgelsen**

Der indledes med en gynækologisk undersøgelse, med en let afvaskning af vagina. Herefter indføres et tyndt bøjeligt plastikkateter op gennem livmoderhalsen og placeres i livmoderhulen. Der sprøjtes væske igennem kateteret samtidig med, at vi foretager ultralydsskanning for at se om der er polypper, muskelknuder, skillevægge eller sammenvoksninger i livmoderhulen.

## **Forholdsregler efter undersøgelsen**

Du bør ikke have samleje, tage karbad eller gå i svømmehal/havbad, så længe du bløder. Du bør bruge bind og ikke tamponer.

## **Bivirkninger**

Der er altid en lille risiko for bivirkninger/gener, når man har haft et kateter oppe i livmoderen.



Bivirkningerne er heldigvis oftest forbigående.

Det er normalt at have menstruationslignende smerter og evt. lidt pletblødning efter undersøgelsen.

Der er en lille risiko for infektion efter indgrebet, dette kan behandles med antibiotika. Du bør reagere hvis du får temperatur  $>38,5$ , stærke smerter og tiltagende udflåd i dagene efter undersøgelsen.